

ADICCIONES

ESTIMULANTES

Estimulación	Cafeína
Distorsión del tiempo y el espacio	Nicotina
Euforia	alucinógenos
Energetizante	Marihuana
Palpitaciones	LSF
Ansiedad	Cocaína
Temblor	Anti-depresores
Nerviosismo	Anfetaminas
Convulsión	Estricnina
Muerte	

TABACO

1592- Walter Raleigh (ingles en América) nicotina (hoja de tabaco)-estimulante cinco mujeres mueren cada hora por tabaco

puerta de entrada a otras drogas (5% es *monóxido de carbono*-escape de coches; *alquitrán*-pavimento; *amoníaco*-explosivos, limpiadores; *cianuro*-veneno; *fenoles*- quita esmaltes)

EFFECTOS

Cada aspiración contiene 3,000 sustancias química

ADICTIVA (Más que heroína)

Ca de pulmón, boca, garganta, esófago

Enf. Cardíacas (baja oxígeno)

Accidente vascular cerebral AVC

Alteración de la coagulación

Gangrena

Enfisema

Bronquitis

Asma

Úlcera estomacal

EN EMBARAZO

Aborto

Bajo peso al nacer

Aumenta riesgo de ca

Disminuye conteo espermático

Muerte súbita del recién nacido

RECOMENDACIONES

No fumar más que 5 al día

No fumar y beber

No mezclar con drogas

Disminuir el alquitrán con filtro

ESTEROIDES ANABÓLICOS

(anavar, sustanon, dianabol)

implantes, comprimidos, inyecciones-
EFECTOS

Aumenta proteínas (hormona de crecimiento, L9H)

Aumenta eritropoietina (espesor de la sangre por glóbulos rojos)

Agresión

Paranoia

DISOLVENTES

(pegamento, bolsita, mona, pájaro verde) volátil, inhalación en tela

Primera causa de muerte en menores de 16

Esmalte, gases de petróleo (*butano*,

propano), aerosoles, encendedores,

disolventes (*benceno*, *hexano*); quita

esmaltes, pegamento (*tolueno* y *hexano*)

EFECTOS

Aumenta adrenalina

Euforia

Borrachera

Taquicardia

Mareo

Risas

Alucinaciones

Suicidio por aturdimiento

Resaca (pérdida de memoria)

Depresión

RECOMENDACIONES

No rociar aerosol en piel o mucosas

No hacer ejercicio

Acompañamiento

Cuidar de incendio

Abrir ventanas

MARIHUANA

delta9tetrahidrocannabinol THC

(canuto, caño, chala, cohete, granja, grifa, yerba, porro, troncho, tuca, mono)

planta- cannabis sativa

se fuma con pipa “bhong”

1.-hierba- hojas y flores secas (verda pardo)

2.-resina- sabia de hojas y tallo prensadas en bloques (negro, marrón)

3.-aceite hashish – resina disuelta en solvente, filtrada y evaporada, verduzca con olor a podrido. Se fuma untándolo en cigarro con tabaco

Hace 8,000 años

Remedio médico (ansiedad, lepra)

Siglo XIX Reina Victoria calmaba

calambres menstruales

EFFECTOS

Relaja

Aumenta conversación

Risas o depresión

Retorijones por hambre

Antojo de dulces

Agudiza los sentidos

Disminuye conteo espermático

Perjudica al feto

Pánico, Paranoia

Aumenta concentrado de alquitrán

Insomnio

NO ADICCIÓN FÍSICA

Pero SI MENTAL

Con éxtasis= deshidratación

Permanece en el cuerpo hasta dos meses

EXTASIS

metilendioximetanfetamina MDMA

Padre= MDA metilendioxianfetamina

Hermana= MDEA

metilendioxietilanfetamina

(Droga dura prohibida, como heroína y cocaína)

Aislado en USA 1912 para auitar apetito

Y calmar la ira; surge en fiestas “rave”

Píldoras con logos; impresos; palomas

“cortada” con impurezas (29mgs MDMA más 170mgs de otra cosa:

antiparasitarios; anfetaminas; *Ketamina*-anestésicos; *selegalina*- Parkinson; talco)

EFFECTOS

Estimulante (speed).

Libera serotonina y dopamina

Sensación de empatía

Agudiza los sentidos (alucinaciones)

Palpitaciones

Mareos

Dura de 30min. A 3 horas

Piel tibia, cosquilleo, colores intensos

Energía, ganas de tocarse, nausea vómitos

Pánico, paranoia

Insomnio

Sueño diurno

depresión

Parálisis muscular

Calor y deshidratación

Falta de coordinación

Alteración del termostato corporal

Inflamación cerebral

Accidente cerebral vascular en 12hrs

Síndrome de abstinencia

Demencia

Parkinson

RECOMENDACIONES

Beber Gatorade, o agua con electrolitos

Comer salado- papitas

Quitar ropa- evitar sobre-calentamiento

Rociar agua en la cabeza

Mantener despierto

NO MEZCLAR

HIERBAS ESTIMULANTES

Efedrina- estimulante

Khat- Africa, Arabia (anfetamina para mascar, en té, pastillas)

EFFECTOS

Euforia

Tranquilizantes

Depresión

Ansiedad

SETAS ALUCINÓGENAS

Psilocybin* *amanita muscaria

(peyote, maravilla, hongos, setas)
cocidas- ingestión; hervidas- infusión;
fumadas)

SETAS COCIDAS- INGESTIÓN

Es lamescalina de los aborígenes
sudamericanos

1935- Aldous Huxley habla de ellas en
“Las Puertas de la Percepción”

1.- *Liberty Cap*- pequeña, amarilla,
sombbrero cónico; en praderas de otoño.

2.- *Amanita Muscaria*- seta grande, roja
con motas blancas, tallo grueso. Otoño.

Se utiliza el sombrero marrón/negro más
fuerte

EFFECTOS

Viaje interior con alucinaciones

Distorsión de los sentidos

Pueden haber pesadillas horrendas

Pánico

psicosis

RECOMENDACIONES

No consumir de malas

No mezclar

No abusar

acompañamiento

ACIDO LSD

Dietilamida de ácido lisérgico

(ácido, tripi, pepas, secantes, sellos,
puntos)

cristales transparentes; papel secante

1943 Albert Hoffman lo descubrió como
estimulante cardíaco

Timothy Leary (años 70's) experimento
con drogas alucinógenas.

EFFECTOS

Intensifica los sentidos

Viajes interiores

Expansión de la mente o mal viaje

NO ES ADICTIVO

Paranoia

Psicosis, recurrencias

RECOMENDACIONES

No tomar angustiado

Siempre acompañado

En lugar seguro, sin excitación

No manejar en 12hrs

Poca cantidad

POPPERS

Nitritos de alquilo, amilo, butilo, isobutilo

(Perico, putazo, alucinógeno, líquido
amarillo)

olor dulce y frutal

En óvulos excitación sexual local (gays)

NO ADICTIVO

EFFECTOS

Euforia

Taquicardia

Mareo

Desmayo

Excitación sexual

Quemaduras

RECOMENDACIONES

No mezclar

No sigas

COCAINA

(coca, nieve, polvo, merca, blanca, pala,
frula, mogra, papusa, papel, meresunda,
mandanga, milonga, farlopa)

parecido a anfetaminas

Aislado de hojas de la planta de coca por
alemanes, siglo XIX

(1886)- coca cola, eliminada en 1903

polvo cristalino (sal fina) en envoltorios
1gm

adulteración PELIGROSA

EFFECTOS

ADICTIVO

Hard drug- prohibida

Dependencia psicológica

Euforia

Energía

Excitación sexual

Daño a fosas nasales (sniffing)-

perforación

Nerviosismo

Taquicardia

Irritabilidad

Violencia

Paranoia

Delincuencia

Pérdida de peso

RECOMENDACIONES

No mezclar

No inyectar

No tomar tranquilizantes

CRACK cocaína procesada

(roca, coca pura)

cristales (granos de arena) amarillos, rosa, blancos

se fuma

EFFECTOS

Droga dura prohibida

ADICTIVA

“upper”- estimulante rápido

bajón súbito

cuidado con adulteración mortal

temblores

síndrome de abstinencia tremendo

paranoia

depresión

agresión

RECOMENDACIONES

No mezclar

No inyectar

ANFETAMINA

alfametilfenotilamina

estimulante del SNC ,sintético

creado hace 100 años por alemán 1887

utilizado para soldados

1.- polvo blanco- sal, aspirada

2.- píldoras- ingestión, inyectada

3.- pasta- envoltorio (paco)

EFFECTOS NO ADICTIVO

Adrenérgico

Taquicardia

Aumenta temperatura

Euforia

Energía (bailar, conversación)

Deshidratación

Ansiedad, pánico

Cansancio, depresión

RECOMENDACIONES

No inyectarse (mejor ingerida)

Acompañamiento

No beber alcohol

Refrescarse,

Descansar

SPEED KING

Metilánfetamina

Estimulante sintético 90-100% pureza

Polvo blanco cremoso (arena) se vende en envoltorios

Píldoras de colores

Cristales transparentes (vidrios)

EFFECTOS ADICTIVO

Dependencia física y psicológica

Euforia

Energía

Invulnerabilidad

Excitación sexual

Alucinaciones

Violencia sexual

Agotamiento

Dolor muscular

Depresión

Nerviosismo

Pánico, paranoia

Psicosis, esquizofrenia

RECOMENDACIONES

Ingerir, no inyectar

No mezclar

DEPRESORES

Ansiolíticos	Tranquilizantes
Euforia	Narcóticos
Pérdida de dolor	Alcohol
Sopor	Barbitúricos
Somníferos	Hipnóticos
Pérdida de conciencia	anestésicos
Convulsión	
Muerte	

ALCOHOL

Data de 3,500^a.C. papiro en Egipto.

Fermentación de azúcares y almidones.

El cuerpo tarda 1 hora en procesar un vaso de vino, o una cerveza o una bebida con una medida de licor. (una unidad)

A menor peso corporal, mayor grado de intoxicación.

Consumo seguro diario: Mujeres 2-3 unidades; hombres 3-4 unidades.

El beber aumenta cinco veces el riesgo de accidentes.

EFFECTOS

Exaltación inicial

Depresión

Afecta coordinación

Engorda

Disminuye la fertilidad y la potencia sexual

Violencia

Síndrome de alcoholismo fetal (en embarazo)

Fases de ingestión:

1.- Ingestión inmoderada

2.- Dependencia- Beber hasta perder la conciencia; pérdida de memoria.

3.- Crónica- Delirium tremens. Afecta la rutina diaria.

Coma

RECOMENDACIONES

Comer antes (leche)

Doblar bebida con agua sin gas

2 vasos de agua antes de dormir

pequeños sorbos

comer cuando se toma

evitar mezclas

evitar acompañar la bebida con refrescos de burbujas

registrar diario de ingesta

pedir taxi- no conducir

no mezclar con drogas (éxtasis o anfetaminas)

no beber a escondidas

no fumar y beber

no beber con medicamentos

TRANQUILIZANTES

Benzodiazepinas

Barbitúricos

Ansiolíticos

Hipnóticos

(medicamentos de receta)

Temazepam- Normisón; Nitrazepam- Mogadón; Diazepam- Plidan, Valium;

Lorazepam- Emotival, Trapax, Ativan.

EFFECTOS

Tranquilidad

Relajación

Euforia

Irritabilidad

Agresión

Paranoia

Depresión

Fatiga

Dependencia

RECOMENDACIÓN

No mezclar con alcohol (hipnótico, sopor)

No usar “uppers” para contrabalancear

No manejar

ROHIPNOL

(primum, roche, rueditas, chochos, chicota)

Tranquilizante potente – Flunitrazepam (familia de Valium)

EFFECTOS

Contrarresta insomnio

Depresión

Somnolencia

Sopor(equivale a 6 latas de cerveza con efecto -8hrs)

Ebriedad inmediata

Expuesto a abuso

coma

RECOMENDACIONES

No mezclar con alcohol

BARBITÚRICOS

(pepas,)inyección, píldoras de gel

Creadas XIX para dormir, disminuye ansiedad

Drogas hipnóticas depresoras

Sumamente adictivas

Amital sódico (azul); *Seconal*

(anaranjada); *Tuinal* (azul y anaranjada)

EFFECTOS

Ojos vidriosos, atontado

Falta de coordinación

Disminuye presión arterial y pulso

Agresión

Neumonía

Hipotermia

Sobredosis-muerte

RECOMENDACIONES

No mezclar con alcohol

No manejar

GHB gamma hidroxibutirato

Antestésico (para cirugía, parecido a Rohipnol)

River Phoenix murió de sobredosis

Popular entre gays

Líquido 40ml; polvo salado, píldoras

NO ADICTIVO

Se agrega a bebidas

EFFECTOS

Pierden inhibiciones

Sociable

Euforia

Cansancio

Nausea, vómito

Desorientación

Dolor muscular

Convulsión

Coma

¿afrodisiaco?

KETAMINA

Anestésico disociativo- depresor

Tranquilizante de caballos

Líquido transparente; polvo en

envoltorio; comprimidos, inyección

Adultera éxtasis.

EFFECTOS

Sensación de separación cuerpo/mente

Disminuye la presión arterial

Euforia

Parálisis

Nausea, vómito

Falta de coordinación,

Visión de tunel, distorsión, alucinación

RECOMENDACIONES

No tomar en autos (ruido, estimulación externa)

No mezclar

PCP fenciclidina (Ketamina)

Polvo de ángel

Anestesia, como anfetamina

Polvo blanco cristalino impuro, líquido

Sniff, fumar, inyectar, líquido se agrega a

tabaco, adultera bebidas

EFFECTOS

Estimula

Falta de coordinación

Alucinación

Agresión

Violencia

Coma, muerte

Trastorno mental permanente

Ansiedad

Paranoia

Depresión

Acumula grasa en el cerebro

NO ADICTIVA

RECOMENDACIONES

No mezclar

No bailar

No ingerir con trastornos mentales

No inyectar

**METADONA physptone –
metasedin (casi igual a heroína)**

Jarabe marrón DTF

Ampolletas transparentes- inyección

EFFECTOS

Alivia dolor

Nausea, constipación

Calambres

Disminuye deseo sexual

Paro respiratorio

ADICTIVO

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

RECOMENDACIONES

No tomar drogas rápidas (éxtasis)

No mezclar

necesidad psicológica

ataque de pánico

insomnio

nausea, diarrea

sudor

escalofrío

espasmos

calambres

temor

RECOMENDACIONES

Inhalar, no inyectar

No mezclar

**HEROÍNA clorhidrato de
diamorfina**

Se procesa del opio (Oriente)

6000^a.C.- opio de adormidera

griegos- adicción siglo 111^a.c.

chinos- inhalación XV11

siglo XV1- Paracelso crea medicamento

siglo XIX- morfina

1874- diamorfina

Analgésico narcótico

(1.- brown- más común; polvo marrón;

impuro; se fuma

2.- base- granos grises (como café); fuma
e inyecta (pipa)

3.- farmacéutica- uso medicinal. Polvo

blanco. Líquido en ampolleta)

(caballo, jaco, chino, speed-ball,

bazookazo)

EFFECTOS

Droga dura

SUMAMENTE ADICTIVA

Calma el dolor, aletarga la mente

Energía, tranquilidad

Insomnio

Dolor muscular

Constipación

Paro respiratorio

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

(monkey on my back)